

CUADRO DE DOSIS ESTÁNDAR PARA LOS MEDICAMENTOS CONTRA EL VIH

UNA PUBLICACIÓN DE
PROJECT
inform
Información,
inspiración y defensa
para las personas
viviendo con VIH/SIDA

ENERO DE 2006

Inquietudes generales sobre la terapia contra el VIH

Lipodistrofia

Un efecto secundario que puede estar relacionado con la terapia contra el VIH, el cual consiste en cambios en la composición corporal o en la distribución de grasa, es llamado lipodistrofia. Este puede incluir pérdida de grasa en ciertas áreas (*lipoatrofia*) o acumulación de grasa en otras (*lipohipertrofia*). Esto incluye pérdida de grasa en la cara (*mejillas hundidas*); pérdida de grasa en los brazos y las piernas; pérdida de la forma de las nalgas; agrandamiento de los senos; un cojín de grasa en la nuca (algunas veces denominado *joroba de búfalo*); y aumento de grasa alrededor de la barriga (algunas veces llamado *obesidad central* o *troncal*, o *barriga de proteasa*). Los posibles efectos secundarios relacionados incluyen cambios en los resultados de laboratorio sobre la manera como el organismo procesa las grasas y los azúcares. Esto incluye cambios en los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa sanguínea.

La toxicidad mitocondrial

La toxicidad mitocondrial es un efecto secundario que puede ser causado por los medicamentos contra el VIH llamada *nucleósidos análogos*. Entre los síntomas están la destrucción celular de los músculos y debilidad (*miopatía*), el adormecimiento y hormigueo de los dedos de las manos y los pies (*neuropatía periférica*), y la inflamación del páncreas

(*pancreatitis*). Un resultado de este problema que puede poner la vida en peligro es la acidosis láctica, que es el producto de tener niveles anormalmente altos de lactato en las células del organismo. En las etapas iniciales de la acidosis láctica, las personas experimentan debilidad muscular, falta de aliento, náuseas, vómito y dolor abdominal. Otra consecuencia de la toxicidad mitocondrial es la esteatosis hepática, o “hígado graso”, el cual a menudo conduce a una acidosis láctica.

Complicaciones de los huesos

Otros efectos secundarios que puede provocar la terapia contra el VIH son las complicaciones de los huesos, incluyendo la necrosis avascular y la osteonecrosis. Estas son causadas por la falta de suministro de sangre a los huesos, lo que conduce al deterioro y muerte del tejido óseo. Esto luego puede producir fracturas o colapsos en los huesos.

Publicaciones

Para más información sobre estos temas, lea las publicaciones; *Lipodistrofia*, *Toxicidad mitocondrial y acidosis láctica*, *Trastornos de los huesos*, e *Interacción de los medicamentos*, disponibles a través de la línea de ayuda en el 1-800-822-7422 y www.projectinform.org.

QUE CONTIENE

Los inhibidores de fusión: 2; Los inhibidores de proteasa: 2-4; Los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a los nucleósidos (NRTIs) y los nucleótidos (NtRTIs) : 5-8; Los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos a los no nucleósidos (NNRTIs): 9.

LOS INHIBIDORES DE FUSIÓN

Fuzeon (enfuvirtide, T20)

Dosis estándar (dos veces al día):
 uno inyección bajo la piel (*hipodérmica*) = 1ml (90mg);
 dosis diaria total = 2ml (180mg).

DOSIS 1 (1ml/90mg)



DOSIS 2 (1ml/90mg)



■ Los efectos secundarios más comunes—reacciones en el sitio de la inyección (98%) incluyendo enrojecimiento, dolor, comezón, hinchazón y endurecimiento de la piel en el sitio de la inyección.

- Raramente han ocurrido reacciones de hipersensibilidad y deberán ser reportadas inmediatamente al médico. Las señales incluyen dificultad para respirar, fiebre acompañada de vómito y sarpullidos, sangre en la orina e hinchazón en los pies.
- En algunos estudios, las personas que utilizaron el Fuzeon contrajeron neumonía de origen bacteriano con mayor frecuencia que aquellos que no utilizaron este medicamento.
- No hay resistencia cruzada con otros medicamentos contra el VIH.
- No hay interacciones significativas con otros medicamentos.

Programa de asistencia a pacientes: 1-877-757-6243 (información solamente), 1-866-694-6670 (enrolar), or www.rocheusa.com/programs

Fabricante y sitio web: Roche Laboratories/Trimeris; www.fuzeon.com

LOS INHIBIDORES DE PROTEASA

Agenerase (amprenavir, APV)

Dosis estándar (dos veces al día):
 una píldora = 150mg; dosis diaria total = 2,400mg.

DOSIS 1 (1,200mg)



DOSIS 2 (1,200mg)



Dosis fortificado con Norvir (RTV) #1 (dos veces al día):
 una píldora = APV 150mg, RTV 100mg;
 dosis diaria total = APV 1,200mg, RTV 200mg.

DOSIS 1
 APV (600mg) + RTV (100mg)



DOSIS 2
 APV (600mg) + RTV (100mg)



Dosis fortificado con Norvir #2 (una vez al día):
 una píldora = APV 150mg, RTV 100mg;
 dosis diaria total = APV 1,200mg, RTV 200mg.

DOSIS 1

APV (1,200mg) + RTV (200mg)



- Entre los efectos secundarios están erupciones (*urticaria*), fatiga, vómito, dolor de cabeza y diarrea.
- Puede ser tomado con o sin comidas.
- La personas que toman la solución oral deben evitar tomar bebidas alcohólicas.
- La solución oral no debe ser tomada por mujeres embarazadas, niños menores de cuatro años, o personas con deficiencia hepática o renal, o por personas que toman disulfiram o metronidazola.

Programa de asistencia a pacientes: 1-866-728-4368, or <http://bridgestoaccess.gsk.com>

Fabricante y sitio web: GlaxoSmithKline; www.gsk.com/products/agenerase_us.htm

Aptivus (tipranavir, TPV)

Dosis fortificado con Norvir (RTV) (dos veces al día):
 una tableta = TPV 250mg, RTV 100mg;
 dosis diaria total = TPV 1,000mg, RTV 400mg.

DOSIS 1
 TPV (500mg) + RTV (200mg)



DOSIS 2
 TPV (500mg) + RTV (200mg)



- Diseñado para actuar en personas cuyos virus han desarrollado resistencia a otros inhibidores de la proteasa.
- Funciona mejor si se toma con Fuzeon.
- Debe tomarse con precaución si existen problemas hepáticos (incluyendo hepatitis B y C).
- Los efectos secundarios más comunes son la diarrea, las náuseas, y la fatiga.
- El Aptivus tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Para más información, consulte la literatura que le entregan con el medicamento.

Programa de asistencia a pacientes: www.rxhope.com

Fabricante y sitio web: Boehringer Ingelheim; www.aptivus.com


Crixivan (indinavir, IDV)

Dosis estándar (tres veces al día):
una píldora = 400mg; dosis diaria total = 2,400mg.




- Debe tomarse cada 8 horas.
- Debe tomarse con el estómago vacío, por lo menos 1 hora antes o 2 horas después de haber comido.

Dosis fortificado con Norvir (RTV) #1 (dos veces al día):
una píldora = IDV 400mg, RTV 100mg;
dosis diaria total = IDV 1,600mg, RTV 200mg.




Programa de asistencia a pacientes: 1-800-850-3430, or
www.crixivan.com/indinavir_sulfate/crixivan/support/index.jsp
Fabricante y sitio web: Merck & Co.; www.crixivan.com

Dosis fortificado con Norvir #2 (dos veces al día):
una píldora = IDV 400mg, RTV 100mg;
dosis diaria total = IDV 800mg, RTV 800mg.




Dosis fortificado con Norvir #3 (dos veces al día):
una píldora = IDV 400mg, RTV 100mg;
dosis diaria total = IDV 1,600mg, RTV 400mg.




- Los efectos secundarios más serios son los cálculos renales. Para reducir el riesgo de cálculos renales, tomar abundante agua diariamente (8 vasos).
- Si se toma en combinación con Videx, tomar Crixivan por lo menos 1 hora antes o 2 horas después del Videx. Una nueva versión del Videx, llamada Videx EC, puede tomarse simultáneamente con el Crixivan.
- Crixivan tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Para más información, consulte la literatura que le entregan con el medicamento.

Invirase (saquinavir, SQV)

Dosis estándar fortificado con Norvir (RTV) (dos veces al día): una píldora = SQV 500mg, RTV 100mg;
dosis diaria total = SQV 2,000mg, RTV 200mg.



Dosis alternativa fortificado con Norvir (dos veces al día):
una píldora = SQV 200mg, RTV 100mg;
dosis diaria total = SQV 2,000mg, RTV 200mg.




- Debe ser tomado con comidas, preferiblemente dentro de las dos horas siguientes a una comida rica en grasas.
- Los efectos secundarios son relativamente raros. Entre los más comunes están la diarrea y las náuseas.
- El Invirase tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Para más información, consulte la literatura que le entregan con el medicamento.

Programa de asistencia a pacientes:
1-800-282-7780, or <http://invirase.com/BoostedInvirase/boosted-patientassistance.asp>
Fabricante y sitio web:
Roche Pharmaceuticals; <http://invirase.com/default.asp>

Kaletra (lopinavir + ritonavir, LPV + RTV)

Dosis estándar (dos veces al día):
una píldora = LPV 133mg/RTV 33mg;
dosis diaria total = LPV 800mg/RTV 200mg.



Para personas que nunca antes han tomado medicamentos contra el VIH (una vez al día): una píldora = LPV 200mg/RTV 50mg; dosis diaria total = LPV 800mg/RTV 200mg.



- Los efectos secundarios más comunes son diarrea, náuseas, dolores de cabeza y falta de energía.
- Puede ser tomado con o sin comidas.
- La dosis del Kaletra debe aumentarse a cuatro cápsulas, dos veces al día si se toma con Sustiva o Viramune.
- El Kaletra tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Para más información, consulte la literatura que le entregan con el medicamento.

Programa de asistencia a pacientes:
1-800-222-6885, or www.HelpingPatients.org
Fabricante y sitio web:
Abbott Laboratories; www.kaletra.com


LOS INHIBIDORES DE PROTEASA

Lexiva (fosamprenavir, FAV)


Dosis estándar #1, *sin* la resistencia de los inhibidores de proteasa (PIs) (dos veces al día): una píldora = 700mg; dosis diaria total = 2,800mg.



Dosis estándar #2, *sin* la resistencia de PIs (una vez al día): una píldora = FAV 700mg, RTV 100mg; dosis diaria total = FAV 1,400mg, RTV 200mg.



Dosis estándar #3, *con* o *sin* la resistencia de PIs (dos veces al día): una píldora = FAV 700mg, RTV 100mg; dosis diaria total = FAV 1,400mg, RTV 200mg.



- El fosamprenavir (Lexiva) se convierte en el amprenavir (Agenerase) dentro del organismo.
- Efectos secundarios y patrones de resistencia similares a los del Agenerase (ver arriba).
- **Cuando se fortifica con Norvir (RTV):** refiérase a los esquemas #2 y #3 mencionados arriba.

Programa de asistencia a pacientes: 1-866-728-4368, or <http://bridgestoaccess.gsk.com>
Fabricante y sitio web: GlaxoSmithKline; www.lexiva.com

Norvir (ritonavir, RTV)

Dosis estándar (dos veces al día): una píldora = 100mg; dosis diaria total = 1,200mg.



- Entre los efectos secundarios más comunes están la diarrea y las náuseas. Estos son peores durante las primeras semanas después de comenzar el terapia.
- Las personas con problemas hepáticos (problemas del hígado como hepatitis B o C) deben tener precaución al usar el Norvir.
- Al comienzo el Norvir, debe usarse en dosis de 300mg dos veces al día por dos días, 400mg dos veces al día por dos días, 500mg dos veces al día por dos días, y luego la dosis estándar de 600mg dos veces al día.
- El Norvir tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Para más información, consulte la literatura que le entregan con el medicamento.
- Consulte con su médico o farmacéutico sobre la dosis de la solución oral.


Programa de asistencia a pacientes:
1-800-222-6885, or www.HelpingPatients.org
Fabricante y sitio web:
Abbott Laboratories; www.norvir.com

Reyataz (atazanavir, ATV)

Dosis estándar (una vez al día): una píldora = 200mg; dosis diaria total = 400mg.



Dosis fortificado con Norvir (RTV) (una vez al día): una píldora = ATV 150mg, RTV 100mg; dosis diaria total = ATV 300mg, RTV 100mg.



- Una sola dosis al día.
- Debe ser tomado con comidas.
- No se han observado efectos en el nivel de colesterol y triglicéridos.
- Algunas personas (entre el 35 y el 47%) tuvieron niveles elevados de bilirrubina, los cuales no indicaron problemas del hígado.
- No debe tomarse simultáneamente con antiácidos de acción prolongada como Tagamet, Prilosec, Prevacid, etc.
- Se deben hacer ajustes a las dosis cuando se usa con Sustiva and Videx/Videx EC.
- El Reyataz tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Para más información, consulte la literatura que le entregan con el medicamento.
- El Reyataz debe ser fortificado con Norvir cuando se toma junto con Viread.

Programa de asistencia a pacientes:
1-800-272-4878, 1-877-758-7877
Fabricante y sitio web:
BristolMyersSquibb; www.reyataz.com

LOS INHIBIDORES DE PROTEASA

Viracept (nelfinavir, NFV)


Dosis estándar #1 (tres veces al día):
una píldora = 250mg; dosis diaria total = 2,250mg.

DOSIS 1 (750mg) DOSIS 2 (750mg) DOSIS 3 (750mg)



Dosis estándar #2 (dos veces al día):
una píldora = 250mg; dosis diaria total = 2,500mg.

DOSIS 1 (1,250mg) DOSIS 2 (1,250mg)



Dosis estándar #3 (dos veces al día):
una píldora = 625mg; dosis diaria total = 2,500mg.

DOSIS 1 (1,250mg) DOSIS 2 (1,250mg)



Dosis fortificado con Norvir (RTV) #1 (dos veces al día):
una píldora = NFV 250mg, RTV 100mg;
dosis diaria total = NFV 1,000mg, RTV 800mg.

DOSIS 1 DOSIS 2

NFV (500mg) + RTV (400mg) NFV (500mg) + RTV (400mg)



Dosis fortificado con Norvir #2 (dos veces al día):
una píldora = NFV 250mg, RTV 100mg;
dosis diaria total = NFV 1,500mg, RTV 800mg.

DOSIS 1 DOSIS 2

NFV (750mg) + RTV (400mg) NFV (750mg) + RTV (400mg)



- Debe ser tomado con comidas.
- Consulte con su médico o farmacéutico sobre la dosis de la solución oral.

- El efecto secundario más común es la diarrea, la cual puede controlarse con medicamentos de venta libre como el Imodium o con "agentes compactantes" como el Metamucil. (Nota: El Imodium puede causar mareo y por eso es mejor tomarlo en la noche.)

Programa de asistencia a pacientes: 1-888-706-2400; or <http://pfizerhelpfulanswers.com>

Fabricante y sitio web: Pfizer Inc.; www.viracept.com

LOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS A LOS NUCLEÓSIDOS (NRTI) Y LOS NUCLEÓTIDOS (NTRTI)

Combivir (lamivudine + zidovudine, 3TC + AZT)

Dosis estándar (dos veces al día):
una píldora = 3TC 150mg/AZT 300mg;
dosis diaria total = 3TC 300mg/AZT 600mg.

DOSIS 1 DOSIS 2

(3TC 150mg/AZT 300mg) (3TC 150mg/AZT 300mg)



- Esta combinación no debe ser usada por personas que pesen menos de 40kg (88 lbs) o que tengan problemas del hígado o del renales.
- Puede ser tomado con o sin comidas.
- Ver los comentarios de las secciones sobre el Retrovir y el Epivir.

Programa de asistencia a pacientes:
1-866-728-4368, or <http://bridgestoaccess.gsk.com>

Fabricante y sitio web:
GlaxoSmithKline; www.teathiv.com/products/combivir.html

Emtriva (emtricitabine, FTC)

Dosis estándar (una vez al día):
una píldora = 200mg; dosis diaria total = 200mg.

DOSIS 1 (200mg)



- Una sola dosis al día.
- Los efectos secundarios del Emtriva son raros, siendo los más comunes dolores de cabeza, náuseas y sarpullidos.
- Pariente cercano del Epivir.
- Con resistencia cruzada al Epivir.
- No existen interacciones significativas con otros medicamentos.

Programa de asistencia a pacientes:
1-800-226-2056, or www.gilead.com/wt/sec/patient_assist

Fabricante y sitio web:
Gilead Sciences; www.emtriva.com

LOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS A LOS NUCLEÓSIDOS (NRTI) Y LOS NUCLEÓTIDOS (NTRTI)

Epivir (lamivudine, 3TC)

Dosis estándar (dos veces al día):
una píldora = 150mg; dosis diaria total = 300mg.

DOSIS 1 (150mg)



DOSIS 2 (150mg)



- Puede ser tomado con o sin comidas.
- Los efectos secundarios asociados con el Epivir son raros, pero pueden incluir dolores de cabeza, náuseas, malestar general, diarrea, anemia y caída del cabello.

Dosis alternativa (una vez al día):
una píldora = 300mg; dosis diaria total = 300mg.

DOSIS 1 (300mg)



- Pariente cercano del Emtriva.
- Resistencia cruzada con el Emtriva.
- Consulte con su médico o farmacéutico sobre la dosis de la solución oral.

Programa de asistencia a pacientes: 1-866-728-4368, or <http://bridgestoaccess.gsk.com>

Fabricante y sitio web: GlaxoSmithKline; www.treathiv.com/products/epivir.html

Epzicom (abacavir + lamivudine, ABV + 3TC)

Dosis estándar (una vez al día):
una píldora = ABV 600mg/3TC 300mg;
dosis diaria total = ABV 600mg/3TC 300mg.

DOSIS 1 (ABV 600/3TC 300mg)



- Una combinación del Ziagen y el Epivir.
- No hay restricción de alimentos.
- Ver los comentarios de las secciones sobre el Ziagen y el Epivir para los efectos secundarios.
- Cerca de un 5% de las personas desarrollan hipersensibilidad al Ziagen, la cual resulta en síntomas gripales o problemas respiratorios como faltas de aliento, tos o inflamación de la tráquea (*faringe*). Si esto ocurre, contacte a su médico inmediatamente; suspender el Epzicom (o Trizivir o Ziagen) inmediatamente. No intente comenzar del nuevo el Epzicom (o Trizivir o Ziagen) sin la supervisión de su médico ya que esto puede conducir al desarrollo de efectos secundarios graves.

Programa de asistencia a pacientes:
1-866-728-4368, or <http://bridgestoaccess.gsk.com>

Fabricante y sitio web:
GlaxoSmithKline, www.epzicom.com/about.html

Retrovir (zidovudine, AZT)

Dosis estándar #1 (tres veces al día):
una píldora = 100mg; dosis diaria total = 600mg.

DOSIS 1 (200mg)



DOSIS 2 (200mg)



DOSIS 3 (200mg)



Dosis estándar #2 (dos veces al día):
una píldora = 300mg; dosis diaria total = 600mg.

DOSIS 1 (300mg)



DOSIS 2 (300mg)



- Puede ser tomado con o sin comidas.
- Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, náuseas y sensación de malestar general. Los efectos secundarios por lo general disminuyen después de seis a ocho semanas de haber iniciado la terapia.
- Puede causar anemia.
- No se deben usar juntos con el Zerit.

Programa de asistencia a pacientes:
1-866-728-4368, or <http://bridgestoaccess.gsk.com>

Fabricante y sitio web:
GlaxoSmithKline; www.treathiv.com/products/retrovir.html

6

CUADRO DE DOSIS ESTÁNDAR • ENERO DE 2005 • PROJECT INFORM

Trizivir (lamivudine + acabavir + zidovudine, 3TC + ABV + AZT)

Standard dosing (dos veces al día):
una píldora = 3TC 150mg/ABV 300mg/AZT 300mg;
dosis diaria total = 3TC 300mg/ABV 600mg/AZT 600mg.

DOSIS 1
(3TC 150mg/
ABV 300mg/AZT 300mg)



DOSIS 2
(3TC 150mg/
ABV 300mg/AZT 300mg)



- No debe ser usada por personas que pesen menos de 40kg (88 lbs) o que tengan problemas del hígado o del renales.
- Puede ser tomado con o sin comidas.

Programa de asistencia a pacientes: 1-866-728-4368, or <http://bridgestoaccess.gsk.com>

Fabricante y sitio web: GlaxoSmithKline; www.treathiv.com/products/trizivir.html

LOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS A LOS NUCLEÓSIDOS (NRTI) Y LOS NUCLEÓTIDOS (NTRTI)

Truvada (emtricitabine +
tenofovir, FTC + TDF)

Dosis estándar (una vez al día):
una píldora = FTC 200mg/TDF 300mg;
dosis diaria total = FTC 200mg/TDF 300mg.

DOSIS 1 (FTC 200mg/TDF 300mg)



- Una combinación del Viread y el Emtriva.
- Ver los comentarios de las secciones sobre el Viread y el Emtriva.

Programa de asistencia a pacientes: 1-800-226-2056, or www.gilead.com/wt/sec/patient_assist
Fabricante y sitio web: Gilead Sciences; www.truvada.com

Videx/Videx EC (didanosine, ddl/ddl EC)

Videx EC (didanosine, ddl EC)
dosis estándar #1 (una vez al día):
una píldora = 400mg; dosis diaria total = 400mg.

DOSIS 1 (400mg)



Videx EC (didanosine, ddl EC)
dosis estándar #2 (1x/day, ver notas):
una píldora = 250mg; dosis diaria total = 250mg.

DOSIS 1 (250mg)



Videx (didanosine, ddl) dosis estándar #1
(dos veces al día):
una píldora = 100mg; dosis diaria total = 400mg.

DOSIS 1 (200mg)



DOSIS 2 (200mg)



Videx (didanosine, ddl) dosis estándar #2
(una vez al día):
una píldora = 200mg; dosis diaria total = 400mg.

DOSIS 1 (400mg)



VIDEX EC Y VIDEX:

- El efecto secundario más grave es la pancreatitis, la cual ha sido fatal para varias personas. Los síntomas incluyen dolor agudo en la parte superior del abdomen, náuseas y vómito. Si esto ocurre, suspenda el medicamento inmediatamente y contacte a su médico. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de pancreatitis.
- Debe ser tomado con el estómago vacío sin comidas.
- Usar Videx/Videx EC con hidroxiurea, puede aumentar el riesgo de pancreatitis.
- La mayoría de los efectos secundarios más comunes incluyen aumentos en los niveles de ácido úrico (indicador de las funciones del riñón), dolor de cabeza, insomnio, diarrea y dolor u hormigueo en las manos y/o los pies (*neuropatía periférica*).
- Las personas que pesen menos de 60kg (132 lbs) deben usar 250mg una vez al día.
- Cuando se usa con el Viread, la dosis del Videx EC debe cambiarse a 250mg.
- Las personas con insuficiencia renal deben consultar a su médico acerca de la dosis.
- No se deben usar juntos con el Zerit o por mujeres embarazadas o que estén planeando quedar en embarazo.
- Se deben hacer ajustes a la dosis cuando se usa con el Reyataz.

VIDEX SÓLO:

- No puede ser tomado dentro de las dos horas siguientes después de haber ingerido un medicamento que requiera un medio estomacal ácido, tales como muchos inhibidores de proteasa y algunas terapias comunes como el dapsone.
- Se recomienda mejor la dosis tomada dos veces al día que la tomada una vez al día.

Programa de asistencia a pacientes: 1-888-706-2400; or http://bmsvirology.com/more_info.html#americares
Fabricante y sitio web: Bristol-Myers Squibb; www.videxec.com

LOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS A LOS NUCLEÓSIDOS (NRTI) Y LOS NUCLEÓTIDOS (NTRTI)

Viread (tenofovir, TDF)

Dosis estándar (una vez al día):
una píldora = 300mg; dosis diaria total = 300mg.

DOSIS 1 (300mg)



- Debe ser tomado con comidas.
- Un efecto secundario potencial es la insuficiencia renal.
- Debe ser usado con precaución si se toma con otros medicamentos que sean eliminados por los riñones, tales como el ganciclovir y el valacyclovir.
- Cuando se usa con el Reyataz, el Reyataz debe fortificarse con el Norvir.
- No se deben usar juntos con el Ziagen.
- Cuando se usa con Videx EC, la dosis del Videx EC debe cambiarse a 250mg.

Programa de asistencia a pacientes:
1-800-226-2056, or www.gilead.com/wt/sec/patient_assist
Fabricante y sitio web:
Gilead Sciences; www.viread.com

Zerit (stavudine, d4T)

Dosis estándar >60Kg o >132 lbs (dos veces al día):
una píldora = 40mg; dosis diaria total = 80mg.

DOSIS 1 (40mg)



DOSIS 2 (40mg)



Dosis estándar <60Kg o <132 lbs (dos veces al día):
una píldora = 30mg; dosis diaria total = 60mg.

DOSIS 1 (30mg)



DOSIS 2 (30mg)



- Puede ser tomado con o sin comidas.
- No se deben usar juntos con el Retrovir.
- El efecto secundario más común es dolor u hormigueo en las manos y/o los pies (*neuropatía periférica*).
- Puede causar anemia.
- Se ha observado cierta incidencia rara de pancreatitis. Los síntomas incluyen dolor agudo en la parte superior del abdomen, náuseas y vómito. Si esto ocurre, suspender el medicamento inmediatamente. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de pancreatitis.
 - Usar Videx/Videx EC o hidroxiurea puede aumentar el riesgo de pancreatitis.
- No se deben usar juntos con el Retrovir o Videx/Videx EC o por mujeres embarazadas o que estén planeando quedar en embarazo.

Programa de asistencia a pacientes:
1-800-272-4878, 1-877-758-7877, or
http://bmsvirology.com/more_info.html#americares

Fabricante y sitio web:
Bristol-Myers Squibb; www.zerit.com

Ziagen (abacavir, ABV)

Dosis estándar (dos veces al día):
una píldora = 300mg; dosis diaria total = 600mg.

DOSIS 1 (300mg)



DOSIS 2 (300mg)



- Puede ser tomado con o sin comidas.
- No se deben usar juntos con el Viread.
- Los efectos secundarios más comunes incluyen náuseas, vómito, dolor de cabeza y fatiga.
- Cerca de un 5% de las personas desarrollan hipersensibilidad al Ziagen, la cual resulta en síntomas gripales o problemas respiratorios como faltas de aliento, tos o inflamación de la tráquea (*faringe*). Si esto ocurre, contacte a su médico inmediatamente; suspender el Ziagen (o Trizivir o Epzicom) inmediatamente. No intente comenzar del nuevo el Ziagen (o Trizivir o Epzicom) sin la supervisión de su médico ya que esto puede conducir al desarrollo de efectos secundarios graves.


Programa de asistencia a pacientes:
1-866-728-4368, or <http://bridgestoaccess.gsk.com>

Fabricante y sitio web:
Glaxo Smith Kline; www.treat hiv.com/products/ziagen.html


LOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS A LOS NO NUCLEÓSIDOS (NNRTIS)

Rescriptor (delavirdine, DLV)

Dosis estándar #1 (tres veces al día):
una píldora = 100mg; dosis diaria total = 1,200mg.



Dosis estándar #2 (tres veces al día):
una píldora = 200mg; dosis diaria total = 1,200mg.



- Puede ser tomado con o sin comidas.
- Puede disolverse en agua u otros líquidos y tomarse inmediatamente.
- El efecto secundario más serio es el urticaria severa, la cual puede requerir hospitalización. La urticaria suele presentarse dentro de las tres primeras semanas de iniciar el medicamento. La urticaria leve puede tratarse con antiestamínicos o con agentes tópicos.
- El Rescriptor tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Para más información, consulte la literatura que le entregan con el medicamento.

Programa de asistencia a pacientes: 1-888-777-6637
Fabricante y sitio web: Pfizer Inc.; www.rescriptor.com

Sustiva (efavirenz, EFV)

Dosis estándar #2 (una vez al día):
una píldora = 600mg; dosis diaria total = 600mg.

DOSIS 1 (600mg)



Dosis estándar #1 (una vez al día):
una píldora = 200mg; dosis diaria total = 600mg.

DOSIS 1 (600mg)



- Debe tomarse con el estómago vacío.
- Los efectos secundarios más comunes incluyen síntomas neurológicos (principalmente perturbaciones en el sueño, vértigos, mareos y falta de concentración).
- Deben ser tomados por la noche para reducir la probabilidad de efectos secundarios neurológicos [también puede ayudar tomar lorazepam (Ativan) o Benadryl].
- No debe ser tomado por mujeres embarazadas.
- Se deben hacer ajustes a la dosis cuando se usa con el Reyataz.
- Interactúa con muchos de los inhibidores de la proteasa. Para más información, consulte la literatura que le entregan con el medicamento.

Programa de asistencia a pacientes: 1-800-272-4878, 1-877-758-7877, or http://bmsvirology.com/more_info.html#americares
Fabricante y sitio web: Bristol-Myers Squibb; www.sustiva.com

Viramune (nevirapine, NVP)

Dosis estándar (dos veces al día):
una píldora = 200mg; dosis diaria total = 400mg.

DOSIS 1 (200mg)



DOSIS 2 (200mg)



- Hay una pequeña probabilidad (4%) de una toxicidad seria en el hígado. La mayoría de los problemas del hígado ocurren durante las primeras 18 semanas de terapia, pero pueden presentarse en cualquier momento.
 - Las mujeres y las personas con recuentos altos de células CD4+ pueden estar en mayor riesgo.

- El efecto secundario más grave es la urticaria severa, la cual puede requerir hospitalización. Por lo general, la urticaria se presenta dentro de las tres primeras semanas de haber iniciado el medicamento. Las erupciones leves pueden manejarse con antiestamínicos o con agentes tópicos.
- La dosis se va aumentando progresivamente durante las dos primeras semanas. Típicamente se comienza con una tableta diaria de 200mg y luego se aumenta a dos tabletas diarias, después de 14 días.
- Puede ser tomado con o sin comidas.
- Consulte con su médico o farmacéutico sobre la dosis de la solución oral.

Programa de asistencia a pacientes: 1-800-556-8317, or www.rxhope.com
Fabricante y sitio web: Boehringer-Ingelheim; www.viramune.com